

○必ずお読みください

## 高齢者用肺炎球菌予防接種について

### ●肺炎球菌感染症とはどんな病気でしょう・・・

肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25～40%を占め、特に高齢者での重症化が問題になっています。侵襲性感染症（化膿性髄膜炎、敗血症、肺炎など）を起こすことがあり、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の起因菌となることもあります。

脾摘患者、無脾症、リンパ腫などの患者では重篤になることが知られています。

### ●予防接種の効果とワクチンの特徴は・・・

肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させます。我が国では、現在、肺炎球菌の90種類以上ある血清型の中で、頻度の高い23種類の肺炎球菌から作られた23価肺炎球菌荚膜ポリサッカライドワクチンを定期接種ワクチンとして使用しています。

### ●副反応は・・・

肺炎球菌ワクチンの副反応として、局所の疼痛、熱感、腫脹、発赤が5%以上認められます。筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、発熱も見られますが、いずれも2～3日で消失します。

また、重い副反応としては、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難、血管浮腫等）、ギラン・バレー症候群、血小板減少性紫斑病、注射部位壊死又は注射部位の潰瘍、蜂巣炎等が報告されています。

### ●予防接種健康被害救済制度とは・・・

予防接種により健康被害が発生し、厚生労働大臣が、予防接種と因果関係があると認定した場合には、市長が健康被害に対する給付を行う救済制度があります。

## ●予防接種を受ける前に注意することは・・・

### 【予防接種を受けることができない人】

- (1) 接種の当日、明らかに発熱のある人（体温が37.5度以上の人）
- (2) 重い急性疾患にかかっていることが明らかな人
- (3) 過去に接種液の成分によって、アナフィラキシー(※)を起こしたことが明らかな人

(※)「アナフィラキシー」というのは、通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗・顔が急に腫れる・全身にひどいじんましんが出る・吐き気・嘔吐・声が出にくい・息苦しいなどの症状に続き、ショック症状になるような激しい全身反応のことです。

- (4) その他、医師が予防接種を受けることができないと判断した人

### 【以下の人は、予防接種前に必ず担当医師に相談してください】

- (1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する人
- (2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある人
- (3) 過去にけいれんの既往がある人
- (4) 過去に免疫不全の診断がされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- (5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを起こすおそれがある人

## ●接種後の注意

- (1) 接種当日は激しい運動を避けてください。（接種当日の入浴は差し支えありません。ただし注射したところをこすらないでください。）
- (2) 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常、数日中に消失します。
- (3) 接種後は自らの健康管理に注意し、もし、高熱や体調の変化、その他局所の異常反応に気付いた場合は、ただちに医師の診療を受けてください。

新型コロナウイルスワクチンを接種される場合は、高齢者用肺炎球菌予防接種との間隔を13日以上あけてください。

お問い合わせは、舞鶴市保健センター(☎0773-65-0065)まで