

## 4. 舞鶴市が実施する予防接種について

接種にあたっては、可能な限り標準的な接種期間・間隔で受けられることをお勧めします。

| 予防接種の種類                                                                                            |    | 対象年齢                   | 接種回数                       |    | 接種間隔                                                                                     |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロタウイルス                                                                                             | 1価 | 生後2か月から<br>生後24週0日まで   | 2回                         |    | 27日以上の間隔を置いて接種<br>初回の標準的な接種間隔は、「生後2か月から生後14週6日までに接種」。(生後15週0日以降の初回接種については、安全性が確立されていません) |                                                                                                                                |
|                                                                                                    | 5価 | 生後2か月から<br>生後32週0日まで   | 3回                         |    |                                                                                          |                                                                                                                                |
| 小児用肺炎球菌                                                                                            |    | 生後2か月から5歳の誕生日の前日まで     | 接種開始が生後2～6か月<br>(標準的な開始時期) | 初回 | 3回                                                                                       | 27日以上の間隔を置いて接種<br>(標準的には1歳の誕生日までに接種)<br>※ただし、初回の2回目・3回目を接種する前に2歳を超えた場合は接種せず、追加接種。<br>※初回の2回目を接種する前に1歳の誕生日を過ぎた場合は3回目は接種せず、追加接種。 |
|                                                                                                    |    |                        |                            | 追加 | 1回                                                                                       | 初回終了後60日以上の間隔を置いて、1歳の誕生日以降に接種<br>(標準的には1歳から1歳3か月までに接種)                                                                         |
|                                                                                                    |    |                        | 接種開始が生後7～12か月              | 初回 | 2回                                                                                       | 27日以上の間隔を置いて接種<br>※ただし、初回2回目が2歳の誕生日を過ぎた場合は接種せず、追加接種。                                                                           |
|                                                                                                    |    |                        |                            | 追加 | 1回                                                                                       | 1歳の誕生日以降に、初回終了後60日以上の間隔を置いて接種                                                                                                  |
|                                                                                                    |    |                        | 接種開始が1歳                    |    | 2回                                                                                       | 60日以上の間隔を置いて接種                                                                                                                 |
|                                                                                                    |    |                        | 接種開始が2～4歳                  |    | 1回                                                                                       |                                                                                                                                |
| B型肝炎                                                                                               |    | 生後2か月から1歳の誕生日の前日まで     | 3回                         |    | 27日以上の間隔を置いて2回接種後、1回目の接種から139日(20週)以上の間隔を置いて3回目接種<br>(標準的には生後2か月から9か月までに接種)              |                                                                                                                                |
| 五種混合1期                                                                                             |    | 生後2か月から7歳6か月になる日の前日まで  | 初回                         | 3回 | 27日以上の間隔を置いて接種<br>(標準的には生後2か月から1歳の誕生日までに27日から56日までの間隔を置いて接種)                             |                                                                                                                                |
|                                                                                                    |    |                        | 追加                         | 1回 | 初回終了後6月以上の間隔を置いて1回接種<br>(標準的には12月から18月までに接種)                                             |                                                                                                                                |
| BCG                                                                                                |    | 生後5か月から1歳の誕生日の前日まで     | 1回                         |    | (標準的には生後5か月から8か月までに接種)                                                                   |                                                                                                                                |
| 麻しん風しん(MR)1期                                                                                       |    | 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで    | 1回                         |    | (1歳の誕生日を過ぎたらできるだけ早期に接種)                                                                  |                                                                                                                                |
| 水痘(水ぼうそう)                                                                                          |    | 1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日まで    | 2回                         |    | 3月以上の間隔を置いて接種<br>(標準的には1歳から1歳3か月になる日の前日までに6月から12月までの間隔を置いて接種)                            |                                                                                                                                |
| 日本脳炎1期                                                                                             |    | 3歳の誕生日から7歳6か月になる日の前日まで | 初回                         | 2回 | 6日以上の間隔を置いて接種<br>(標準的には3歳から4歳の誕生日の前日までに6日から28日までの間隔を置いて接種)                               |                                                                                                                                |
|                                                                                                    |    |                        | 追加                         | 1回 | 初回の2回目終了後6月以上の間隔を置いて接種<br>(標準的には4歳から5歳の誕生日の前日までにおおむね1年の間隔を置いて接種)                         |                                                                                                                                |
| 麻しん風しん(MR)2期                                                                                       |    | 小学校就学前の1年間             | 1回                         |    | (4月から6月までのできるだけ早期に接種)                                                                    |                                                                                                                                |
| ●10歳(日本脳炎2期)、12歳(二種混合2期)で受ける予防接種があります。(予診票は、対象年齢になる頃にお送りいたします。)乳幼児期にきちんと予防接種を受けて基礎免疫をつけておきましょう。    |    |                        |                            |    |                                                                                          |                                                                                                                                |
| ●接種時期が対象年齢を超えた場合、任意接種となり全額自己負担となりますので、早めの接種をお勧めします。なお、長期に渡り療養中で接種ができなかった場合は、こども家庭センターまでお問い合わせください。 |    |                        |                            |    |                                                                                          |                                                                                                                                |